

Piercing, Perforación, Forma de Arte Corporal.

Más allá de moda, riesgo, ganas de tener un arete, estética, debemos analizar algunos riesgos. “¿Qué me puede pasar? Eso le ha pasado a otros, a mi no.” Tienes razón, quizá no te suceda, pero es algo que debes conocer antes de tomar una decisión.

Los lugares más frecuentes son: cejas, lóbulo de la oreja, nariz, pabellón de la oreja (cartílago), labios, lengua, ombligo. Otros lugares menos frecuentes: frenillos, úvula, áreas genitales.

La mayoría de veces las perforaciones son hechas por alguien no profesional, que desconoce la anatomía y los riesgos que se corren. El procedimiento es realizado sin anestesia, o con solo una crema que duerme en forma superficial y las condiciones de higiene óptimas son dejadas de lado.

¿Qué riesgos corres?

Las consecuencias inmediatas son: hemorragia, dolor, hinchazón (aumento de tamaño), pérdida de la función, mal aliento, por ejemplo, la lengua adolorida e hinchada, no te dejará tragar, hablar y a veces ni respirar.

Algunas consecuencias de consideración:

- Puedes contagiarte de SIDA y Hepatitis.
- Puedes adquirir infecciones, muy difíciles de tratar por el tipo de bacterias que viven en la boca.
- Inflamación de ganglios próximos a la perforación.
- Los aretes expansivos te dejarán una marca de por vida.
- Puedes sufrir desgarres si el arete se traba.
- Si se desprende, pones en peligro tu vida, puedes ahogarte.
- Dentro de la boca, causarán fracturas en tus dientes de adelante (sacrificas tu sonrisa), la encía que rosa con el arete se corre hacia abajo dejando ver la raíz de tu diente, el cual tendrá un aumento de sensibilidad (dolor) al frío y al calor.
- Si sufres de diabetes, alguna enfermedad auto inmune, enfermedad cardíaca, y lo desconoces, puedes tener dificultad para cicatrizar, aumenta la probabilidad de infección y pones en peligro tu vida.
- Alergias al material.
- Aumento de salivación.
- Dificultad para la higiene adecuada de tu boca, el sarro se acumula en el metal del arete.
- En la piel: irritación por resequedad, de no tratarla te lleva a infección y posible cicatriz por agrandamiento del tejido vecino.

Complicaciones que ponen en peligro tu vida:

- Absceso Cerebral, inconsciencia y muerte.
- Angina de Ludwig, infección que pasa a los espacios entre los músculos del cuello y de no lograr llegar hasta las bacterias, muerte.

IMPORTANTE RECORDAR

La piel es nuestra barrera de protección contra el medio ambiente, al perforarla estás exponiendo al organismo al ataque de bacterias oportunistas, que son las que normalmente viven en piel y mucosas pero no causan daño pues no pueden entrar.

Fuentes consultadas

1. Asociación Dental Americana, ADA Position and Statements. 2004
2. Er, Özkavaf, Berberoğlu, Journal de Periodontología Nov 2000
3. Brooks, Hooper, Reynolds, JADA 2003
4. Grenier, Andiran, Léo-François, JCDA Mayo 2007
5. Feliciano, Nilma Posgrado Odontopediatria UPR, 2006
6. Roberts, Timothy Universidad de Rochester, Escuela de Medicina.